


Epidèmies varies !

Les recents notícies han posat el sector boví a l'ull de l'huracà i han esverat a tothom.



(de fet va tardar 3 anys a baixar ja que la incubació és molt llarga).

Justament és això el que preocupa: si les persones poden contagiar-se i el període d'incubació és molt llarg, quanta gent es posarà malalta? Hem de pensar que al Regne Unit, fins que van descobrir els prions, es van consumir de 50 a 200,000 bovins afectats de BSE. Tothom està pendent de les estadístiques que, mes a mes, es van publicat al Ministeri de Salut britànic. A la segona gràfica es pot veure els 80 i escaig casos apareguts superposats amb la data de inici, notificació, mort i confirmació. De Juny de 1998 a Juny de 1999 hi ha hagut força casos. Segons la evolució que prengui aquesta corba, es prendran més o menys mesures, hi haurà més o menys pressió dels mitjans de comunicació, i per tant es veurà afectat el consum més o menys.

Pel que respecta als animals la "epidèmia" sembla controlada i en descens però cal mantenir els controls sanitaris a la cadena alimentària humana i també bovina. S'està investigant nous mètodes diagnòstics per descobrir els animals portadors.

Cal esperar i veure com evoluciona el nº de casos en humans per començar a donar per tancada una de les etapes més negres de la ramaderia bovina.

Probablement el públic s'adoni que la incidència en la salut humana no és proporcional a la que ha tingut en els mitjans de comunicació.

La FEBRE AFTOSA ja es prou coneguda per tots els ramaders. És un virus molt contagiós i tothom tem que s'expandeixi donat el elevat numero de desplaçaments d'animals que hi han. La soca que hi ha és la "O" dita Panasiàtica. Afecta a porcs, bovins i ovins encara que sembla que els ovins tarden més a manifestar els símptomes, cosa que ha propiciat que contagiessin més.

Encara és molt lluny per posar en marxa mesures extremes, però no estaria de més prendre algunes precaucions. Sense entrar en histerismes exagerats, cal pensar que els dies abans de aparèixer un focus, els contagis entre granges són molt freqüents. Després ja és massa tard. Nosaltres recomanem:

- ✓ **Evitar l'entrada d'animals o de transports de bestiar que no estiguin desinfectats. Si més no mantenir els transports allunyats del bestiar.**
- ✓ **Posar calç viva o desinfectant eficaç al camí d'accés a la granja. Costa poc i és una barrera eficaç.**
- ✓ **Tenir unes botes per les visites.**

Aquestes són prou efectives per tallar un 90% de les causes de contagi.

