

# FULL INFORMATIU

LA LLETERA DE LA SELVA

MAIG-96

## **ASSEGUANCES CEREALS**

**D'HIVERN:**(Blat,ordi,civada).

Preu aproximat 1000 pts. Ha.En produccions de 1000 Kg. vessana aproximadament.

Contractació fins 10/6/96.

**DE PRIMAVERA:**(Blat de moro -gra- i sorgo).

Preu aproximat 4500 pts/Ha.

Contractació fins 31/7/96.

## **TRACTAMENTS INTRAMAMARIS.**

(Traducció i adaptació d'un article de Eric Maerten a la revista "France Agricole" de Maig/96).

**EVITAR ELS INHIBIDORS.**

*Jean-Pierre Ausenac posa tots els seus medis per tal d'evitar "l'accident residuus"*

La prevenció de mamitis redueix el risc de produir llet amb residus. Aquest estudi fou dirigit per elGTV(Groupements techniques Veterinaires)fet, arrel de la campanya nacional de l'operació "Zero inhibidors",sobre una enquesta a 1000 productors penalitzats per la presència d'inhibidors a la llet.

La gran majoria tenia un recompte cel.lular superior a 250.000/ml o bé havien patit una epidèmia de mamitis.

Per la seva part Jean-Pierre Ausenac tracta d'evitar aquest risc mitjançant metodologia i organització. És un productor de llet amb una trentena de vaques holstein a 6.500 litres de mitjana,amb 35 Ha.,segueix molt de prop el recompte cel.lular: "Vull baixar el nº de cel.lules que actualment és de 130.000/ml per això pretenc reemplaçar el tractament de secatje de tres setmanes per un de llagra durada", la duració del secatje serà igualment de 2 mesos."L'àrea d'exercici és insuficient, massa vaques o pocs metres,per evitar l'aparició de mamitis sobre tot en novembre tracto de

*compensar-ho fent més jaç,a raó de 10 Kg/vaca/dia i estic molt pendent dels animals per tal de detectar el mínim brot de mamitis".*

*" Perque la fèina de control de les vaques tractades sigui més fácil segueixo un planing que m'ha subministrat el veterinari. Amb unes fitxes plásticas a on hi consten les vaques tractades i el tractament concret de cadascuna, és de molt bon consultar i sobretot és ràpid".*El camió de recollida passa un cop cada dos dies i la llet amb inhibidors està penalitzada amb 30 centims per litre de tota la llet del mes. (30 centims de franc són aproximadament 7 pts).Els animals tractats són perfectament identificats amb cintes de Velcro a la pota.

**ELS VUIT PARANYS A L'HORA DE FER TRACTAMENTS.**

**EN EL TRACTAMENT DE MAMITIS CLINIQUES:**

- 1-Oblidar separar la llet tractada. Normalment per manca d'una bona identificació del animal o manca d'una pissarra dins la sala de munyir.
- 2-No respectar el temps d'espera correcta,lliurar llet de quartos no tractats d'una vaca tractada o aplicar dos xerriques en el mateix quarto.
- 3-Utilitzar productes inadequats,per exemple fer servir medicaments intramusculars i posar-los dins la mamella....
- 4-Productes per via general mal utilitzats,no tinint en compte el seu plaç d'espera.
- 5-Restes de llet tractada dins els gerros de la munyidora i que pot contaminar tot el tanc.
- 6-Bidó de derivació massa petit.

EN EL TRACTAMENT DEL SECATJE.

7-Vaques seques que passen a munyir-se!.Vaques que s'han aixugat més tart del compte.

8-No respectar el període ca-lostral,una llet pot arribar a marcar hasta el dia 7 post-part.

### **MARQUEULESVAQUES.**

La Cooperativa subministra de forma gratuïta braçalets de Velcro per tal que os sigui més fàcil identificar els animals que hagin sigut tractats amb antibiòtic.Demaneu-los al veterinari.

No cal que os fem memoria de les greus repercussions econòmiques que representen per cadescun les penalitzacions degut a la presència d'inhibidors,pero es que a partir d'ara les centrals ja primen la llet lliure d'antibiòtic.

### **MUGRONS CURTS: MENYS CEL.LULES**

S'ha trobat una correlació entre la longitud dels mugrons i el recompte cel.lular.Les vaques amb mugrons curts tenen menys cel.lules.És una altra dada a tenir en compte a l'hora d'inseminar.

### **NO ESPEREU MASSA DE LA FACILITAT DE PART.**

En general s'espera massa d'un toro que té facilitat de part.

La facilitat de part és una dada que es posa a la carta de prova del toro a modus orientatiu , per tal de tenir-ho en compte a l'hora d'inseminar les vedelles,però la facilitat de part depen també d'altres coses,com són els factors ambientals i de maneig.Per exemple,una vedella ha d'arribar al part pesant al voltant de 600 Kgr. i a més té necessitat d'arribar-hi havent fet una bona conformació i estructura óssia ja en els ultims 3 mesos de gestació,per altre part el vedell creix molt a les 2 últimes setmanes.

El que a vegades sol passar es que si la

vedella no arriba al part ben preparada de pes es preten recuperar-lo en les últimes setmanes donant-li més aliment,cosa totalment adversa amb la facilitat de part.

### **MÉS VITAMINES:MÉS SALUT, MENYS CEL.LULES.**

Un aport correcte de Vitamina E i de Seleni vol dir:més defenses,menys infeccions,menys mamitis i menys cel.lules.

El moment més important per donar Se són els 21 dies abans de parir,en forma oral o bé també es pot donar per via intarmuscular o subcutània.

Causes que provoquen una deficiència de Se:1-Noves tècniques d'adobament dels camps.

2-Aprofitament al màxim dels terrenys destinats a la producció de ferratges.

Efectes d'una deficiència de Se:

1-Baixa activitat reproductora.

2-Distrofia muscular.

3-Baixada de defenses.

4-Metritis

5-Quistes ovarics.

6-Mamitis.

### **PRÉSTECES PER EQUIPAMENTS.**

Import: 70% de l'inversió(1).

Interès:Fix. Es publica quinzenalment.

Aquesta setmana (20/5/96) el 8,71%.

Plaç:5 anys.

Comissions:Sense comissions.

Amortització:Pagaments semestrals de capital i interessos.El primer any només es paguen els interessos.

Ventatjes addicionals: Assegurança d'accidents fins a 5 millions.Tarja de gas-oil i Visa gratuïtes el primer any.

(1)Exclúit l'IVA.

Interessats dirigir-vos al Sr. Rafel Roig.