



## Condicció corporal (II):

Després del pic de lactació, la condició corporal es recupera poc a poc. És en aquesta etapa que la fertilitat és millor.

La qualitat de la llet millora progressivament. Durant els primers 3 mesos de lactació la llet pot arribar a tenir un 0,20- 0,30% menys de greix i proteïna. A partir del 70,90 o 100 dies la llet ja es correspon a la mitja del tanc. El temps que tarda a normalitzar-se també és important de conèixer.

PROGRAMA DE GESTIÓ DE VAQUES ReprGTV.											
(C)Joan Galí Usuari:Grup Tècnic Veterinari											
*** GRAFICA GENERAL DE L'EXPLOTACIÓ ***											
DATA:02-11-98 -DE 1 PART A 99 PART											
Total:414 dies 9,918 litres 3.80%G 3.28%P Mitja:23.99											
305 dies 8,222 litres 3.69%G 3.19%P Mitja:26.96											
60											
56											
52											
48											
44											
40		2									
36	1										
32		-									
28											
24											
20											
16											
12	28.1	32.1	31.7	30.2	28.8	26.1	24.0	21.8	21.4	20.9	16.9
8	3.68	3.63	3.62	3.69	3.63	3.65	3.66	3.93	3.80	3.93	4.18
4	3.09	3.04	3.09	3.17	3.19	3.20	3.32	3.36	3.34	3.48	3.65
0											
Nº:	100	91	66	56	52	48	39	30	17	12	8

La CC (condició corporal) es recupera gradualment. És important que no sigui massa ràpid, ja que si la vaca tarda molt a quedar prenyada, s'engreixarà massa. La qualitat de la llet de les vaques (habitualment sobrealimentades, ara) augmenta fins a nivells extraordinaris (3,94%G-3,48%P en l'exemple).

	PUNTAU-CION	Procesos espinosos	Procesos espinosos y transversos	Procesos transversos	Estantes de los procesos transversos	Tuberosidades coxal e isquiática	Entre las tuberosidades isquiática y coxal	Entre los coxales	De la base de la cola a la tuberosidad isquiática
ESTRUCTURA OSEA OBVIA	1.75			1/2 del proceso visible					Huesos promin. Cavidad en "U"
	2.00	Procesos individuales evidentes	Depresión obvia	Entre 1/2 y 1/3 visible		Prominente	Muy hundido	Depresión definida	
	2.25				Estertería prominente		Cobertura delgada		
	2.50		Curva cóncava suave						Comienza a haber grasa
COBERTURA EQUILIBRADA	2.75	Anguloso			Estertería ligeramente visible			Depresión moderada	
	3.00		Pendiente suave	Apariencia suave		Suave	Depresión		Cobertura de tejido adiposo
	3.25			< 1/4 visible					
	3.50	Curvas suaves Procesos no evidentes				Cubierta	Depresión ligera	Depresión ligera	Huesos redondeados. Línea de depresión
	3.75								

En aquesta etapa la CC hauria de passar de 2,5 a 3, i finalment a un màxim de 3,5,3,75.

La vaca seca caldrà que mantingui el pès. No es convenient que vinguin a parir a més de 4 punts de CC. Més pot causar problemes de post part: febres de la llet, retencions, cetosis, desplaçament d'estomac,... La vaca que està massa grassa és la que menja menys després del part.

Aprendre a valorar la condició corporal de les vaques (en conjunt) és una bona eina per controlar si l'aplicació real de l'alimentació és l'adequada. La CC i les dades del control lleter treballades ens permeten veure la relació entre la producció de llet, l'alimentació i el pès. Hem analitzar les dades en relació als dies post part i en relació a la producció de llet (quantitat i qualitat). A part del problemes reproductius i metabòlics, aquesta feina té una vessant econòmica indubtable.

**Una bona alimentació és la suma d'una bona ració + una bona pesada + una bona distribució.**