

LA EUTANÀSIA EN ANIMALS

Realitzar eutanàsies és una de les facetes menys agradables de la nostra professió a la que algun dia, tard o aviat i per motius diversos, tots els veterinaris clínics ens hi hem d'enfrontar.

Malgrat tot, ja que són les persones designades legalment per a realitzar aquesta tasca, amb els anys hem anat desenvolupant tècniques i pautes (amb la col.laboració inestimable dels nous productes farmacològics) més ràpides, humanitàries, indolores, i sobretot, poc traumàtiques tant pels animals afectats, com pels seus propietaris, així com pel veterinari que realitza aquest acte clínic.

Actualment la majoria de veterinaris només solem realitzar eutanàsies en situacions límit i després d'haver valorat tots els pros i els contres per a intentar solucionar el problema; i les anomenem: “**eutanàsies humanitàries**”.

Aquestes situacions límit a les que ens referim solen ser, per ordre d'importància:

- 1- Diagnòstic mèdic molt greu o procés patològic terminal en el que no es pot garantir un mínim de qualitat de vida a l'animal ni a curt ni a llarg plaç.
- 2- Manca de qualitat de vida suficient per a l'animal (abandonats, rodamons, problema per a la salubritat pública o seguretat vial, ...).
- 3- Animals amb problemes patològics de comportament, sobretot per mostres d'agressivitat extrema amb persones.

Definicions terminològiques

1- Eutanàsia:

Es considera l'acte d'induir la mort a un animal de companyia de forma humanitària; es a dir, d'una manera afable, benigna, sensible, compasiva i caritativa.

Qualsevol mètode d'eutanàsia ha de produir, per aquest ordre, una pèrdua de consciència, una aturada cardio-respiratòria i un cessament de l'activitat cerebral; tot de la manera més ràpida possible.

També han de reunir les següents característiques:

- Evitar l'excitació, la por i l'estress psicològic.
- Ser fiable.
- Ser irreversible.
- Ser senzill d'administrar.
- Ser segur per a l'operador.
- Ser estrictament acceptable.

2- Consciència:

Des del punt de vista fisiològic, és l'estat en que el cervell és capaç de reconèixer el medi extern. Si no hi ha estímul cortical l'animal no pot sentir dolor ni estar conscient.

3- Dolor:

És la sensació que resulta dels impulsos nerviosos que arriben al cortex cerebral. Perque un animal senti dolor és necessari que el seu cortex i subcortex cerebrals estiguin intactes i segueixin funcionant. Si el cortex cerebral deixa de funcionar per l'efecte de drogues anestèsiques, per un shock elèctric, una hipòxia o per una contusió, l'animal no experimentarà dolor.

Per aquesta raó l'elecció del mètode d'eutanàsia és menys important si l'animal ha estat anestessiat prèviament o roman inconscient.

La preparació tècnica

De la mateixa manera que s'ha de respectar el criteri del veterinar que no vol realitzar eutanàsies, tots els veterinaris que les hagin de realitzar han de conèixer perfectament la biologia i el comportament de les diverses espècies animals, els mètodes més adients per a efectuar-les i la legislació actualitzada sobre benestar animal.

És molt improbable que cap mètode per a eutanasiar animals satisfaci totes les característiques i criteris exposats anteriorment. Per tant, el veterinar ha d'estar suficientment preparat com per a triar el sistema més humà i eficaç segons l'espècie animal de que es tracti.

Els veterinaris que practiquen eutanàsies han de mostrar un alt grau de professionalitat i sensibilitat per la vida animal.

La destrucció dels cadàvers

Ha d'evaluar-se correctament la possibilitat de que les restes dels animals sacrificats puguin transmetre malalties al personal que pugui estar en contacte amb ells. Així mateix es tindrà la màxima cura amb la possibilitat de contaminació del medi ambient amb les restes procedents d'aquests animals.

El més convenient és la **incineració** del cadàver, o el seu **enterrament**, en una fosa que reuneixi les condicions higiènico-sanitàries que indiqui la normativa vigent.

Altres comentaris generals sobre els mètodes d'eutanàsia

- Els productes utilitzats per a realitzar eutanàsies en animals de companyia produeixen la mort, bàsicament de dos maneres: hipòxia i depressió dels núclis neuronals, provocant una aturada cardio-respiratòria. Sempre que s'utilitzi el mètode d'hipòxia l'animal ha d'estar prèviament inconscient.
- Si l'animal a eutanasiar és molt difícil de manejar o molt agressiu, es pot recórrer primer a altres drogues tranquilitzants o sedants, injectables o per via oral.
- **NO S'HAN D'UTILITZAR MAI DROGUES QUE NOMÉS PRODUEIXIN PARÀLISI MUSCULAR.** La mort que s'aconsegueix amb les drogues d'aquest grup és per asfíxia, molt dolorosa i l'animal està conscient fins l'últim moment.
- **CAL UTILITZAR SEMPRE DROGUES QUE PRODUEIXIN UNA INCONSCIÈNCIA DE MANERA RÀPIDA AMB POSTERIOR ATURADA CARDIO-RESPIRATÒRIA AMB CESAMENT DE LES FUNCIONS VITALS.**